



藥物成分

劑型

櫃號

Salicylic acid

外用藥膏

版本：TPE202309 / 檔號：2023-737

## ☞ 藥品商品名及含量

速立康軟膏 25 毫克/克 (Salic Ointment)

## ☞ 藥品作用

有軟化、溶解及剝離角質層的功能，可治療頭皮屑、濕疹、角化症或各種角化性皮膚炎(例如毛囊角化症)。

## ☞ 使用方式

1. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
2. 清淨患部後，將本品適量塗擦於患部，每日 1-2 次，使用後建議保持塗抹部位透氣，勿密封。
3. 請依照醫師指示使用，不可自行調整建議使用量或使用次數。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因本藥成分引起過敏或有深部皮膚組織感染。
2. 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並前往眼科就醫。
3. 使用本藥可能發生的副作用為皮膚紅斑、搔癢、刺痛感，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻停藥並就醫：水楊酸效應(症狀為耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等，常見於大範圍和長期使用)、皮膚大面積紅斑或嚴重刺痛感、意識混亂、持續頭痛與呼吸喘。
5. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師。