

藥物成分

劑型

櫃號

Metronidazole 外用藥膏

版本:TPE202309/檔號:2023-294

- 經 無 所 品 名 及 含 量 益 膚 康 凝 膠 7.5 毫 克/公 克 (Efucon Gel) 膚 麗 凝 膠 7.5 毫 克/公 克 (Free Gel)
- **50** 藥品作用 適用於因酒渣鼻引起的發炎性丘疹、膿疱及紅腫。

50 使用方式

- 1. 一般每天早晚各一次。
- 2. 清潔皮膚之後,將藥膏塗抹於乾燥患部,使之形成薄層, 並輕輕按摩。
- 3. 請依照醫師指示使用,不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記,請立即補用,但若已接近下一次使用時間, 在下次用藥時間使用即可,不可為了補用而使用雙倍劑量。

知 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是有血液疾患。
- 2. 若使用部位太靠近眼睛,可能刺激流眼淚。
- 3. 治療期間,應避免使用含酒精的保養品。
- 4. 建議存放於陰涼乾燥處,避免日光直射。
- 5. 常見副作用為皮膚短暫的發紅、乾燥,但一般都不嚴重, 若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 6. 如果有下列症狀,請立刻就醫:皮膚灼熱刺激、皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛。
- 7. 女性計畫懷孕、已懷孕、哺乳請告知您的醫師。