



藥物成分	劑型	櫃號
Torsemid	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-781		

☞ 藥品商品名及含量

妥速適錠 5 毫克/錠 (Torsix Tablets)

☞ 藥品作用

治療鬱血性心臟衰竭、腎疾病、肝臟疾病及慢性腎衰竭所引發的水腫症狀，高血壓。

☞ 服用方式

1. 通常每日一次，每次 1~4 錠。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 如有藥物過敏史，特別是曾對此藥或磺脲類(sulfonylurea)藥物過敏者，或是有其他疾病，請告訴醫師或藥師。
2. 不可用於無尿患者。
3. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。在直到您習慣此藥對您的影響前，應避免開車、操作機械或從事危險性高的動作。
4. 服藥後可能會有姿勢性低血壓情形發生，即從坐姿或躺姿站起來時，會有頭暈目眩的情形。因此站起來時，應儘可能的放慢速度。
5. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請先告知醫師。特別是非類固醇消炎止痛藥、阿斯匹靈、其他利尿劑、毛地黃、鋰鹽。
6. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。
7. 常見副作用為頭暈、頭痛、噁心、高血糖、尿液過多、高尿酸血症、低血鉀症、口乾、性功能障礙，但一般都不嚴

重。若症狀嚴重又持續時，請回診。

8. 如發生過敏、起泡、脫皮、紅疹、聽力下降或耳鳴、肌肉痙攣、排尿困難、一側或腰部疼痛、嚴重腹瀉或胃痛、食道出血，請立即就醫。
9. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
10. 請置於 25°C 以下，避光、避濕、且在孩童拿不到的環境下儲存。