

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Trichlormethiazide

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-436

## ☞ 藥品商品名及含量

服爾伊得安錠 2 毫克/錠 (Fluitran Tablets)

壓宜寧錠 2 毫克/錠 (Eazide Tablets)

## ☞ 藥品作用

作用在腎臟遠曲小管的利尿劑。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日使用 1 次，每次 1~2 粒。

2. 建議白天服用，若超過晚間六點服用可能因尿意而影響睡眠。

3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不良病史。

2. 本藥的利尿作用可能會急遽發生，需特別注意電解質不平衡（如低血鈉症、低血鉀症）及脫水副作用。

3. 本藥可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。

4. 可能的藥物副作用：發疹、潮紅、光敏感、電解質不平衡、高尿酸血症、高血糖症、姿態型低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 胎兒的風險未被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師。

6. 本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。