

藥物成分

劑型

櫃號

Miglitol

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-669

## ☞ 藥品商品名及含量

麥若醣膜衣錠 50 毫克/錠 (Migbose®)

抑醣錠 50 毫克/錠 (Miglitol®)

## ☞ 藥品作用

第二型糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 本藥建議之起始劑量為 25mg 每日 3 次，於主餐第一口時服用。
2. 部分病患起始劑量為 25mg 每日 1 次，來降低胃腸道副作用，再慢慢增量到 25mg 每日 3 次。
3. 本藥建議之維持劑量為 50mg 每日 3 次。
4. 本藥之最大建議劑量為 100mg 每日 3 次。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 常見副作用為腸胃道症狀(例如:脹氣、腹瀉、腹痛)，而發生腹瀉、腹痛的症狀，會隨治療時間漸漸消失。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟疾病者，腎功能不良(血清肌酐高於 2 mg / dL); 不建議使用。
3. 不建議同時使用碳水化合物分解酶(如澱粉酶，胰酶)的消化酶製劑。
4. 糖尿病酮酸血症、發炎性小腸疾病、結腸潰瘍、腸道阻塞、慢性小腸疾病、腸道疾病(顯著的消化或吸收障礙)、慢性疾病或由於氣體形成增加而可能惡化的疾病患者禁用本品。
5. 懷孕分級: B 級。