



藥物成分	劑型	櫃號
Empagliflozin	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-183		

☞ 藥品商品名及含量

恩排糖膜衣錠 10 毫克/錠 (Jardiance)

恩排糖膜衣錠 25 毫克/錠 (Jardiance)

☞ 藥品作用

用於治療第二型糖尿病、心臟衰竭、減少腎臟疾病惡化、預防心血管事件。

☞ 服用方式

1. 通常為每日 1 次，每次 1 粒，或依照醫師指示。可與食物一起服用，亦可空腹服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟疾病，包含透析病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、糖尿病促敏劑、胰島素。
3. 常見副作用為腸胃不適、低血糖、泌尿道感染、暈眩、嘔吐、排尿增加、低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：如果有下列症狀，請立刻就醫：乳酸酸中毒、酮酸中毒(不明原因過度換氣、肌肉痛、嗜睡、心跳緩慢、寒冷)；嚴重泌尿道感染(生殖器部位紅腫熱痛、發燒)；過敏反應(血管水腫、蕁麻疹)；急性腎臟損傷(急性疾病、嘔吐、嘔吐、過度熱暴露)。
5. 由於動物資料顯示有不良腎臟影響，因此不建議在懷孕第二孕期和第三孕期使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您

臺北市立聯合醫院的醫師。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應，服藥期間不建議哺乳。