



藥物成分

劑型

櫃號

Furosemide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-224

☞ 藥品商品名及含量

來喜妥錠 40 毫克/錠 (Rasitol)

通舒錠 40 毫克/錠 (Uretropic)

☞ 藥品作用

為利尿劑，作用於腎臟使得過多的水分和鹽類能從身體藉由尿液排出體外。可以用來治療很多不同的問題，例如心臟或肝臟、腎臟疾病、高血壓等。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒，或需要時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 furosemide、磺胺藥物(sulfa drug)或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、降血壓藥、抗凝血劑(如 Warfarin)、其他的利尿劑、類固醇。
3. 不可與酒精併服，可能會加重副作用。
4. 常見副作用為：低血鉀、高血糖、低血壓。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(如搔癢、臉部或手部腫脹、聽力喪失、嚴重腹瀉、眼睛或皮膚變黃、異常出血。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。