

藥物成分

劑型

櫃號

**Iron+ Folic acid+
Cyanocobalamin**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-244

☞ 藥品商品名及含量

鐵達血膠囊 150 毫克+1 毫克+0.025 毫克/顆 (Ferrin)

富鐵隆複方膠囊 150 毫克+1 毫克+0.025 毫克/顆 (Ferich Forte)

☞ 藥品作用

用於鐵、葉酸、維生素B12之缺乏症的補充。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血色沉著病、血鐵質沉著症者、遺傳性半乳糖耐受性缺乏症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 elvitegravir 成分之抗病毒劑。
3. 使用前應確知貧血種類及原因，應優先改善貧血原因。
4. 常見副作用為便秘、瀉下、噁心、嘔吐、黑便、胃痛，但一般都是短暫發生且不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：低血壓、心跳過快、昏睡、抽筋甚至昏迷。
6. 本藥請置於孩童不易拿取處，以免誤服有中毒的可能。
7. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，另因本藥可能會分泌到母乳中，若有需要哺乳，請事先諮詢醫師/藥師。