



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Fexofenadine</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-209		

## ☞ 藥品商品名及含量

艾來錠 180 毫克 (Allegra)

敏帝膜衣錠 180 毫克 (Alledine F.C.)

艾來錠 60 毫克 (Allegra)

樂抗敏膜衣錠 60 毫克 (Fexodine)

## ☞ 藥品作用

緩解成人及6歲以上兒童的季節性過敏性鼻炎及慢性自發性蕁麻疹相關症狀。

## ☞ 服用方式

1. 大於 12 歲以上青少年與成人通常建議每日 1 次，每次 180 毫克或每日 2 次，每次 60 毫克；6~11 歲建議從每日 2 次，每次 30 毫克開始服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 腎功能不良者，請依醫囑指示使用。
2. 對成分過敏者應避免使用。
3. 使用藥物期間請勿同時喝蘋果、葡萄柚或橘子果汁。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥、抗生素，或制酸劑。
5. 常見藥物副作用為頭痛、咳嗽、發燒、疼痛或中耳炎等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前對胎兒的風險不明、分泌到母乳的量不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。