



藥物成分	劑型	櫃號
Racecadotril	口服懸液 顆粒劑	
版本：TPE202309／檔號：2023-370		

☞ 藥品商品名及含量

瀉必寧懸浮液用顆粒劑 10 毫克/包 (Hidrased Infants Granules for Oral Suspension)

☞ 藥品作用

3個月以上嬰兒及兒童之口服補充液體及輔助性急性腹瀉症狀治療。

☞ 服用方式

1. 一般每天 3 次，每次 1-2 包，可加入食物中或少量水，充分混合後立即服用。
2. 劑量請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因為使用血管收縮素轉化酶抑制劑(如 captopril、enalapril、lisinopril、perindopril、ramipril)發生血管性水腫。
2. 本藥含蔗糖，因此禁用於罕見遺傳性疾病(果糖不耐症、葡萄糖-半乳糖吸收不良症候群、蔗糖酶-異麥芽糖酶缺乏症)的病人。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重皮膚反應 (包括血管性水腫)、扁桃腺炎、出疹、紅斑。**
5. 嬰兒及兒童在用藥期間，可維持正常哺乳或授乳，並監測足夠的液體被攝入。
6. 目前對胎兒的風險不明，懷孕不建議使用，女性計畫懷孕

臺北市立



或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。