



藥物成分

劑型

櫃號

Pioglitazone

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-702

## ☞ 藥品商品名及含量

愛妥糖錠 30 毫克/錠 (Actos)

安索糖錠 30 毫克/錠 (Anxotos)

## ☞ 藥品作用

本藥可刺激胰島素作用在肌肉、脂肪組織及肝臟，達到控制血糖的效果，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，飯前或飯後服用皆可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟衰竭、心臟病、高血壓、冠狀動脈疾病、肝臟功能異常或膀胱癌。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 本藥可能造成體液滯留而有水腫或體重增加的情形，過多的體液會惡化心衰竭或心臟問題，須謹慎使用。
4. 可能會有輕微體重上升，但一般皆可藉由飲食或運動控制。
5. 常見副作用為：水腫、頭痛、體重增加、肌肉痠痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚/眼睛變黃、視力模糊、極度疲憊、血尿(尿液顏色變深)、頻尿、排尿疼痛或嚴重噁心嘔吐等，請立刻就醫或回診。
7. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用

臺北市立

聯合醫院

用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。

8. 若女性計畫懷孕請告知醫師/藥師；本藥無法排除對嬰兒的影響，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。