



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Prasugrel hydrochloride</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-712		

## ☞ 藥品商品名及含量

抑凝安膜衣錠 3.75 毫克/錠 (Efient F.C. tablets)

抑凝安膜衣錠 5 毫克/錠 (Efient F.C. tablets)

## ☞ 藥品作用

本品為一種前驅藥物，在轉換為其活性代謝物後，透過選擇性且不可逆結合至血小板的受體，抑制血小板凝集作用。適用於需要冠狀動脈介入性治療的急性冠狀動脈症候群。

## ☞ 服用方式

1. 起始劑量為單次使用 20mg 口服劑量，隨後的維持劑量則採用每日一次 3.75mg 口服劑量。
2. 起始劑量以外是不建議於空腹情況下服用本藥。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏(如 clopidogrel)或是有其他疾病，特別是具有出血傾向或出血體質的病人(血友病、顱內出血、消化道出血、尿道出血、咳血、玻璃體出血等)、具有腦梗塞或暫時性腦缺血(TIA)病史、肝腎功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑(如 warfarin、heparin 和 edoxaban)、抗血小板藥物(如 aspirin)、血栓溶解劑(如 urokinase 和 alteplase)、非類固醇抗發炎藥物(NSAIDS)如 loxoprofen 和 naproxen。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。

4. 常見副作用為腹瀉、便秘、噁心/嘔吐、眩暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：異常出血症狀、意識混亂、過敏反應(包括血管性水腫)。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，哺乳母親在服用本藥時應避免授乳。