



## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Clonazepam

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-555

☞ 藥品商品名及含量 (藥物學理分類：Benzodiazepines, BZD)  
 利福全錠 0.5 毫克/錠 (Rivotril)  
 克癩平錠 0.5 毫克/錠 (Clonopam)

☞ 藥品作用  
 本藥主要用來減緩焦慮、緊張，亦可作為安眠、安定自律神經或肌肉痙攣之輔助治療劑。

☞ 服用方式

1. 請遵照處方使用，勿自行增加藥量、服藥次數或服藥日數。
2. 如果連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(焦慮、睡不著、易怒)，如有問題請洽詢藥師或醫師。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，於下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是急性狹角性青光眼、重肌無力症、嚴重呼吸功能不足、癲癇、肝、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥類藥物、鴉片類藥物、BZD 拮抗劑 Flumazenil。
3. **本藥可能會讓人嗜睡、警覺性及協調能力降低，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 請勿吸煙，吸煙會降低此類藥物的藥效。
6. 常見副作用為虛弱、頭暈、嗜睡、步態不穩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：話多、不安、焦慮、亢奮、發抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃。

8. 本藥在懷孕期間使用有致畸胎的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。