

藥物成分

劑型

櫃號

**Diphenhydramine/
Bismuth/Benzocaine
/Zinc oxide**

**外用
藥膏**

版本：TPE202309／檔號：2023-161

☞ 藥品商品名及含量

平痔隆軟膏 5/50/50/100 毫克/20 克 (Benazon Ointment)

☞ 藥品作用

用於緩解痔瘡症狀。

☞ 使用方式

1. 均勻適量塗抹藥膏於肛門部位，每日使用 1-3 次。
2. 若需使用於內痔，可使用盒內注入器，將注入器前端插入肛門後，注入軟膏使用。
3. 本藥膏**僅能皮膚外用**，使用於肛門外部或直腸末端內，不可用於眼部。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾經對本藥膏的成分過敏或是有其他疾病，特別是排尿困難、過去曾有青光眼的病史。
2. 使用本藥品後，可能有皮膚起疹、發紅、刺痛感等症狀，也可能讓人嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
3. 使用後若**出現虛弱、神經混亂、呼吸困難或皮膚呈現蒼白灰色或藍色**，或是使用 7 天後症狀未改善或惡化，請立即**停藥並就醫**。
4. 請放陰涼處保存，勿冷藏或冷凍。
5. 使用本藥品目前對胎兒風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有顯示致畸胎的紀錄，女性若有生育計劃或已懷孕請告知醫師。
6. 若為 2 歲以下嬰幼兒或是有哺乳需求的婦女，請勿使用本藥膏。