



藥物成分

劑型

櫃號

Sulfasalazine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-758

## ☞ 藥品商品名及含量

撒樂腸溶錠 500 毫克/錠 (Salazine E.C.T.)

## ☞ 藥品作用

具有抗發炎、免疫抑制及抗菌的作用，用於治療發炎性腸道疾病及類風濕性關節炎。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1~4 次，每次 1~2 粒，腸溶錠切勿咬碎，請於飯後配一大杯水整粒吞服。
2. 醫師會依個人之反應及適應情形調整藥物劑量。請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對磺胺類或乙醯水楊酸類藥物過敏、蠶豆症、腸阻塞、尿道阻塞、血液疾病、紫質症或肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強心劑 digoxin、葉酸或其他免疫抑制劑。
3. 本藥可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。服用期間尿液或皮膚可能偏黃橘色，是正常無害的。
4. 常見副作用有噁心嘔吐、腹痛、食慾不振、頭痛、皮疹、搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、出血症狀(出血不止或

瘀青、血尿等)、腎功能異常(尿量減少、高血壓、蛋白尿等)、肺炎(呼吸困難、氣喘)、異常疲倦或虛弱。

6. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中，有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。哺乳：本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。