



藥物成分	劑型	櫃號
Loratadine/ Pseudoephedrine	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-656		

## ☞ 藥品商品名及含量

莫鼻卡持續性藥效錠 5/120 毫克/錠 (LoraPseudo S.R.)

特敏福持續性藥效錠 5/120 毫克/錠 (Minlife-P)

## ☞ 藥品作用

緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。
2. 本藥為長效劑型設計，服用時不可嚼碎，必須整顆吞服。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是狹角性青光眼、尿滯留、重度高血壓、重度冠狀動脈疾病或甲狀腺機能亢進之病人，禁止使用本品。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑。
3. 服藥期間請勿飲酒
4. 本藥可能會讓人覺得嗜睡、疲倦，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為眼乾、頭痛、神經過敏、口渴、失眠、心跳過速，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請停藥並回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：原因不明的發燒、畏寒、心跳快速或不規則、呼吸困難或抽搐。

臺北市立

聯合醫院

TAIPEI CITY

TAIPEI CITY HOSPITAL

7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。