

藥物成分

劑型

櫃號

Fenotereol/
Ipratropium噴霧
吸入劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-637

藥品商品名及含量

備喘全定量噴霧液 50 微克 + 20 微克 / 每噴
200 噴 / 罐 (Berodual N Metered Aerosol)

外
盒外
觀

H 用藥指導短片

含輔助器



不含輔助器



藥品作用

本藥可預防和治療氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、肺氣腫或支氣管痙攣。主要用於緩解急性發作。

使用方式

1. 請依照醫師指示使用本藥品，通常每次 1~2 個定劑量，每天不得吸入超過 8 個定劑量。
2. 通常在投與 2 個劑量後症狀會緩解，若狀況嚴重且 5 分鐘後呼吸狀況仍未改善可再投與 2 個劑量，如 4 個劑量後呼吸狀況仍無緩解，可能需要再投與數個劑量時，必須立即請教醫師或就近送醫。
3. 在新的定量噴霧液裝置開始用前，要先下壓活塞 2 次，有白色霧狀氣體噴出後，每次劑量皆按照下列步驟使用：


A. 先移去口含器的護蓋。



B. 將噴霧劑上下搖晃使藥品混合均勻。



C. 朝旁邊深深吐完肺中氣體。



D. 含住口含器，按壓一下後以**正常速度慢慢深深地吸氣**。




E. 之後閉氣**5~10**秒鐘，再慢慢地由口呼氣後，就可正常呼吸。(若呼吸沒有改善需要吸第2次劑量，請間隔**30~60**秒後再重複一次步驟2~5，不可連續按壓兩次)。

4. 清潔方式

- (1) 先取下口含器的護蓋，並移去吸入器中的藥罐。
- (2) 用溫水清洗吸入器。(如圖一)
- (3) 清洗完請甩乾吸入器後**請陰乾**，切勿用任何加熱裝置烘乾。(如圖二) 待全部乾燥後再裝上藥罐及護蓋即可。



(圖一)



(圖二)

5. 此藥無指示視窗可供觀測剩餘量，請諮詢藥師如何記錄使用量(需人工紀錄)。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心肌病變或心律不整。
2. 常見副作用為咳嗽、口乾、頭痛、噁心、暈眩、心悸，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 本藥成分中的 Fenotereol 對子宮收縮具有抑制作用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
4. 本藥可能會分泌到母乳裡，但以噴霧劑形式投與，應不會在嬰兒體內達到具有意義的濃度，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。