



藥物成分

劑型

櫃號

Telbivudine

口服藥

版本：TPE202309 / 流水號：2023-412

☞ 藥品商品名及含量

喜必福膜衣錠 600 毫克/錠 (Sebivo)

☞ 藥品作用

用於治療慢性B型肝炎病毒感染。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1 次，每次口服 600 毫克。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否會對 Telbivudine 過敏。
2. Telbivudine 不建議用於對 lamivudine 或 entecavir 具抗藥性的病患。
3. 若您正在服用干擾素(如:珮格西施 Pegasys®)或其他移植後抗排斥藥物、降血脂的 Statin 類及 Fibrin acid 類藥物、抗黴菌感染的 Azole 類藥物請先告知醫師。
4. 若您的腎功能不佳或是有腎臟疾病，請告知您的醫師，因為使用 Telbivudine 會依據您的腎功能狀況做調整。
5. 服用 Telbivudine 期間，並不能減少 B 型肝炎傳染給他人的危險，仍應小心防範。
6. Telbivudine 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：眩暈、頭痛、噁心、腹瀉、皮膚紅疹、肌肉酸痛及疲倦等。
7. 孕婦用藥等級：B。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
8. 若您有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。