



藥物成分	劑型	櫃號
Dutasteride/ Tamsulosin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-178		

☞ 藥品商品名及含量

多適達膠囊 0.5 毫克及 0.4 毫克/膠囊 (Duodart)

☞ 藥品作用

作為治療有症狀的攝護腺肥大症第二線治療用藥，緩解相關症狀。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，需吞服整粒膠囊，每日固定於同餐後約 30 分鐘服用。
2. 切勿嚼食或打開膠囊服用，直接接觸膠囊內容物可能對口咽部黏膜造成刺激。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 dutasteride、tamsulosin、其他 5-alpha reductase 抑制劑產生明顯的過敏反應(如嚴重皮膚反應、血管水腫、蕁麻疹、搔癢、呼吸道症狀)。
2. 本藥可經由皮膚吸收，婦女及兒童應避免接觸破損的膠囊，可能因此而吸收 dutasteride，對男性胎兒可能造成胎兒異常的危險，若接觸到破損的膠囊，應立即以肥皂及清水沖洗接觸處。
3. 常見副作用為性慾降低、輕度的勃起不能、直立性低血壓(姿態性低血壓、頭暈及眩暈)。
4. 使用本藥期間及停藥 6 個月內不可捐血，這段延遲期間目的是防止接受輸血的孕婦接觸到 dutasteride。
5. 本藥可能對胎兒造成異常的危險，禁用於婦女及兒童。