



藥物成分

劑型

櫃號

Ramelteon

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-372

## ☞ 藥品商品名及含量

柔速瑞膜衣錠 8 毫克/錠 (Rozerem)

## ☞ 藥品作用

用於治療入睡困難型失眠。

## ☞ 服用方式

1. 就寢前 30 分鐘服用 0.5-1 粒。避免和高脂肪餐點一起服用，或進食高脂肪餐點後立即服用本藥。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Zolpidem。
3. 請勿飲用酒類，酒精會減少此類藥物的安眠作用。
4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為嗜睡、疲倦、頭暈、噁心、失眠惡化，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管水腫、呼吸困難、喉頭腫脹、嘔吐。
7. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，泌乳婦女在治療期間或服用本藥後 25 小時內，可考慮中止哺乳，將乳汁擠出丟棄，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。