



藥物成分	劑型	櫃號
Secukinumab	針劑	

版本：TPE202309／檔號：2023-388

## ☞ 藥品商品名及含量

可善挺注射液劑 150 毫克/毫升 (Cosentyx Solution for Injection)

## ☞ 藥品作用

可抑制促發炎細胞激素和趨化激素之釋放，用於斑塊性乾癬、乾癬性關節炎及僵直性脊椎炎治療。

## ☞ 使用方式

1. 常見劑量為每次 1-2 支皮下注射，起始時於第 0、1、2、3 和 4 週注射，接著於第 4 週開始每 4 週皮下注射。兒童劑量醫師會依據體重調整。
2. 本藥注射筆、注射針筒及小瓶須於 2-8°C 冷藏。藥品應放於原包裝外盒中避光儲存直到要用時才取出，不可搖晃以避免起泡。本品不含防腐劑，沒用完的部份要丟棄，如非必要，可在室溫陰涼處儲存 4 天，避免陽光直射及熱源，超過 4 天請勿使用。
3. 注射部位：大腿、腹部、上臂外側。不要在敏感會痛的、受傷的、發紅的、有硬塊的或有乾癬的皮膚部位注射，每次注射部位都要不同，不可注射在肚臍周圍 5 公分區域。
4. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是結核病、克隆氏症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 接受本品治療時，不可接種活性疫苗，注射非活性疫

苗，可能不會誘發足夠免疫反應來預防疾病，應於開始施打本藥前依據現行預防接種基準，完成當時所需接種的疫苗。

4. 常見副作用為腹瀉、上呼吸道感染、感冒症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應、感染徵兆(發燒、肌肉痠痛、呼吸急促、痰中有血、皮膚發紅疼痛、腹瀉或胃痛、小便時有灼熱感或頻尿等)。
6. 對胎兒的風險不明，目前臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。