



藥物成分

劑型

櫃號

Nicorandil

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-683

☞ 藥品商品名及含量

喜革脈錠 5 毫克/錠 (Sigmart Tablets)

喜必諾錠 5 毫克/錠 (Silvinol Tablets)

☞ 藥品作用

用於治療狹心症。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用三次，每次一錠。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請將忘記服用的劑量略過，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 由於(1)嚴重的肝機能障礙患者；(2)青光眼患者；(3)心臟衰竭患者，須謹慎地用此藥，若有以上疾病請告知醫師。
3. 不可併服 Sildenafil citrate(Viagra® 威而鋼) Vardenafil monohydro-chloride (Levitra® 樂威壯)。併用會增強降壓效果，可能引起嚴重低血壓。
4. 服用後可能出現暈眩、虛弱、心悸等，發生時請立刻躺下或坐下以緩解症狀。若症狀持續，請立即就醫。
5. 本藥常見副作用包含：頭痛、口腔炎、口腔潰瘍、心悸、面色潮紅、噁心、嘔吐、食慾不振，當症狀嚴重或持續時，請回診。
6. 如出現過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難)、黏膜破或疼痛、肝功能異常症狀(深色尿、極度疲倦、灰白色糞便、皮膚或眼睛變黃)，請立即就醫。
7. 孕婦使用 Nicorandil 之資料十分有限，該資料未顯示有胎兒先天異常的高危險性。但正在懷孕中的婦女或是有可能懷孕的婦女，最好不要使用 Nicorandil。

臺北市立

8. 本藥於嬰兒餵母乳的安全性尚未證實，若有餵母乳的需求，請事先詢問醫生或藥師。

9. 請置於攝氏 25°C 以下、乾燥環境儲存，並存放於兒童不易取得之處所。