



藥物成分

劑型

櫃號

Abemaciclib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-467

☞ 藥品商品名及含量

捷癌寧膜衣錠 150 毫克/錠 (Verzenio)。

☞ 藥品作用

晚期或轉移性乳癌的內分泌治療。

☞ 服用方式

1. 與 fulvestrant、內分泌療法(tamoxifen 或芳香環酶抑制劑)併用時，捷癌寧膜衣錠的建議劑量為 150 毫克，每次一顆，每日口服兩次。
2. 捷癌寧膜衣錠應整粒吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。錠劑若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
3. 應於每日固定時間服用，若服藥後嘔吐或錯過平日服藥時間，請依照排定時間服用下一劑藥物。

☞ 注意事項

1. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
2. 本藥會造成疲倦和頭暈，服藥後請勿開車或操作危險機械。
3. 可能的藥物副作用：腹瀉、感染、嗜中性球低下症、貧血、疲倦、噁心、嘔吐和食慾不振。
4. 若有發燒(特別是如果伴隨有感染的徵兆)、肝功能異常、血栓栓塞等症狀應立即回診。
5. 一旦發現有稀便的情況，應立即回診告知醫師，必要時須開始止瀉劑治療(例如 loperamide)，並增加口服液體攝取量。

☞ 其他注意事項

1. 有生育能力的女性使用捷癌寧膜衣錠之前，應檢測是否懷孕。
2. 具有生育能力的女性，在治療期間及接受最後一劑治療後 3 週應採用有效的避孕措施。

臺北市立

3. 哺乳婦女於治療期間及接受最後一劑治療後**3週**內不可哺乳。

4. 捷癌寧膜衣錠含有乳糖，具乳糖不耐症、乳糖酶完全缺乏等遺傳疾病之病人不應使用此藥。