



## 藥物成分

Bunazosin

## 劑型

口服藥

## 櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-077

## ☞ 藥品商品名及含量

迪坦妥持續性藥效膜衣錠 3 毫克/錠 (Detantol)

## ☞ 藥品作用

適用於高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常成人每日一次，初始劑量從 3mg 開始，每日最多以 9mg 為限制，服用此藥物應直接吞服，切勿咀嚼。
2. 依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不全者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑或他類降壓劑、Sildenafil(威爾鋼)等藥物，應注意其交互作用。
3. 投藥初期可能會導致姿勢性低血壓引起的眩暈等症狀，從事需警覺性工作者(如:駕駛車輛、操作機械)應謹慎使用。
4. 常見副作用為頻尿、顏面潮紅、水腫、噁心、眩暈、睏倦等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

## ☞ 其他注意事項

1. 已懷孕或有懷孕的計劃的婦女，應主動告知您的醫師並評估藥品使用風險及利益，方可使用。
2. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。