



藥物成分	劑型	櫃號
Acemetacin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-005		

## ☞ 藥品商品名及含量

痛立安長效膠囊 90 毫克/膠囊 (ACEO Retard)

## ☞ 藥品作用

為非類固醇消炎藥，治療風濕性關節炎、退化性關節炎(骨關節炎)、僵直性脊椎炎、痛風、肌肉炎、腱炎、腱鞘炎、滑囊炎等炎症。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。急性痛風時每日 2 次，每次 1 粒。
2. 可與食物併服或不併服。膠囊須整粒吞服不可咬破、咀嚼、分開或壓碎。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胃腸潰瘍、肝腎功能障礙、心肌梗塞、中風、癲癇、帕金森氏症病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 **digoxin、phenytoin、鋰鹽**。
3. 如有要進行冠狀動脈繞道手術，請事先告訴醫師或檢查醫事人員或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、頭暈、皮疹、蕁麻疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重上腹痛、黑便、極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。

臺北市立

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示在懷孕前、中期應避免使用，孕期最後三個月禁止使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。