

藥物成分	劑型	櫃號
Domperidone	肛門栓劑	
版本：TPE202309／檔號：2023-165		

☞ 藥品商品名及含量

冬培力栓劑 10 毫克 (Domperidone)


☞ 藥品作用

無法口服情況下，用於噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異。

☞ 使用方式

「成人」及「12歲以上體重大於35kg之青少年」：1次10~30mg，每日最多2次。

「12歲以下兒童」及「12歲以上體重小於35kg之青少年」：1次10mg，每日最多3次。



☞ 注意事項

1. 下列情形禁止使用：

(1) 患有釋出泌乳激素腦下垂體腫瘤(Prolactinoma)之病人。

(2) 併用 Ketoconazole 口服藥品。

(3) 刺激胃蠕動可能造成危險時，禁止使用 Domperidone，如出現腸胃道出血、機械性阻塞或穿孔。

(4) 中度至嚴重肝功能障礙者。

2. 由於小兒投予也有錐體外症狀，意識障礙，痙攣的發現，因此一歲以下的小兒應特別注意用量，而三歲以下的乳幼兒應避免超過七天的連續使用。

3. 於成人及孩童，Domperidone 應使用最低有效劑量治療。

4. 禁忌用於已知有心臟傳導問題，特別是 QT 延長，有顯著電解質異常(低血鉀、高血鉀、低血鎂)，或心搏徐緩，或有心臟疾病，如鬱血性心衰竭者，可能會增加心室心律不整的風險。

5. 儲存: 貯於 25°C 以下避光儲存並置於兒童不及之處。