



藥物成分	劑型	櫃號
Colchicine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-131		

## ☞ 藥品商品名及含量

秋水仙鹼片 0.5 毫克/錠 (COLCHICINE)。

驅風錠 0.5 毫克/錠 (Colchicine)。

## ☞ 藥品作用

痛風。

## ☞ 服用方式

1. 本藥須由醫師處方使用。

2. 預防痛風發作：一般成人及大於 16 歲青少年預防痛風發作的劑量為 0.5 mg，每天 1-2 次。最大建議劑量為 1 mg/天。

3. 治療痛風發作：


(1) 痛風發作時的最初劑量為 1 mg，然後一個小時後再服用 0.5mg，或 0.5mg 一天 3 次，最大劑量 1.5 mg。第二天以後 0.5 mg 每天 1-2 次直到發作症狀緩解。重複療程需間隔至少 3 天。

(2) 原本已使用 colchicine 預防痛風發作的患者，若有必要亦可將 colchicine 用於治療痛風發作，劑量為 1 mg，然後一個小時後服用 0.5 mg。等待 12 小時後恢復預防痛風發作時的劑量。

## ☞ 注意事項

1. 由於兒童及青少年療效及安全性尚未建立，不建議使用於兒童及青少年。

2. 大量使用或誤用時，在服用後數小時內就會引起下列急性中毒症狀，故應嚴守用法、用量規定，並注意(A)、(B)兩項：噁心、嘔吐、腹痛、激烈下痢、咽頭、胃、皮膚之灼熱感、血管障害、休克、血尿、少尿、明顯的肌肉脫力感，中樞神經系之上行性麻痺、譫妄、痙攣、呼吸抑制而導致死亡。



- (A). 治療痛風的發作，一次投與 0.5 mg 就會緩解疼痛之發作，一直到下痢、嘔吐等胃腸障礙發生為止，每 3~4 小時投與一次，一日量以 3~4mg 為限。
- (B). 為避免副作用之發生，要以比產生胃腸障礙的劑量再減少 0.5~1.0mg 投與。
3. 由於長期投與，有時會引起血液障害、肝、腎障害等，故用於預防疼痛發作時，請注意作檢尿，末梢血檢查(特別是白血球)以及肝功能的定期檢查。
  4. 下列患者請慎重投與：老年人，身體非常衰弱的患者(特別是有腎疾病、胃腸疾病和心臟疾病的患者)。
  5. 長期投與：有時會有再生不良性貧血、顆粒球減少、白血球減少、血小板減少、脫毛、皮疹、肌肉病變、末梢神經炎、血尿、少尿等症狀發生，應仔細觀察。如有這些症狀發生，應即停止投與。
  6. 過敏症：有時會有全身搔癢、發疹、發熱等症狀，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應即停止投與。
  7. 胃腸：有時會有下痢、噁心、嘔吐、腹痛、腹部疝痛等較嚴重的胃腸障害發生，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應做減量投與或暫時停藥等的處理
  8. 有時會有脫力感現象發生。
  9. 孕婦或可能懷孕之婦女，以不投與為原則。
  10. 男生服用本劑時，其配偶有可能出生 Down's Disease 及其他先天性異常兒之報告。

## ☞ 藥品儲存

25°C 以下，避光保存(日光直接照射會變質)。