



藥物成分

劑型

櫃號

Raltegravir

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-371

☞ 藥品商品名及含量

宜昇瑞膜衣錠 400 毫克/錠 (Isentress)

☞ 藥品作用

治療人類免疫缺乏病毒感染。

☞ 服用方式

1. 通常一日 2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肺結核、肝功能障礙。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含鋁鎂制酸劑、Atazanavir、Tipranavir/ritonavir。
3. 常見副作用為噁心、眩暈、腹瀉、腹痛、疲倦無力，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮膚反應前兆(發疹、發燒伴隨的發疹、疲勞、肌肉/關節痛、起水泡、口腔病變、結膜炎、面部水腫、血管性水腫)。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 有鑑於餵哺母乳，可能會使嬰兒感染人類免疫缺乏病毒、對病毒產生抗藥性、發生不良反應的風險上升，服藥期間不建議哺乳。