



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Gramicidin /</b> <b>Neomycin /</b> <b>Nystatin /</b> <b>Triamcinolone</b>	外用藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-308		

## ☞ 藥品商品名及含量

美康乳膏 (Mycomb Cream)

康適研乳膏 (CoshiYan Cream)。

## ☞ 藥品作用

廣效性局部皮膚治療劑。具抗炎、止癢、殺菌和殺黴菌作用，用於治療濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染(念珠菌感染)。

## ☞ 使用方式

1. 將本藥膏塗擦於患處，每日 2 至 3 次。
2. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 本藥品限用於皮膚，禁用於點眼，亦不可在眼圈附近塗敷。
3. 藥品應置於攝氏 25 度以下乾燥處所，避光儲存。如發生變質或過期，不可再使用。
4. 對孩童患者使用本藥時，應在有效療程內，給予最低量及最短期的治療；並應嚴密監測全身性副作用的症狀。