

藥物成分

劑型

櫃號

Lithium Carbonate

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-280

☞ 藥品商品名及含量

立定錠 300 毫克/錠 (LIDIN)

鋰利靜錠 300 毫克/錠 (LILITIN)

☞ 藥品作用

可用於治療躁症，預防躁鬱症。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用 3~4 次。請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟、甲狀腺、心臟血管、腦神經系統疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、降壓藥、抗癲癇藥品、氣喘藥、消炎止痛藥等。
3. 服藥期間請攝取足夠的鹽分和水分。如發生水分過度流失或腹瀉伴隨感染及發燒，請告訴您的醫師。
4. 本藥可能會讓人疲倦或暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為嗜睡、噁心、食慾降低、口乾、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、嘴唇眼皮腫脹、胸痛、呼吸困難)、心跳變快或變慢、腹瀉、嘔吐、暈眩、運動失調、視野模糊及尿失禁等。
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。