



藥物成分	劑型	櫃號
Sofosbuvir/ Velpatasvir	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-753		

☞ 藥品商品名及含量

宜譜莎膜衣錠 400/100 毫克 (Epclusa F.C.)

☞ 藥品作用

透過抑制C肝病毒的RNA複製來治療成人/12歲以上且體重至少30公斤之兒童的慢性C型肝炎病毒感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，可隨/不隨食物整粒吞服。
2. 此藥有苦味，不建議將膜衣錠剝半或磨粉使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，18 小時內請立即補服，若超過 18 小時，則在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
4. 如果在服藥後 3 小時內發生嘔吐，應再補服用一錠。如果在服藥超過 3 小時之後發生嘔吐，則不須另外補服。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 sofosbuvir、velpatasvir 引起過敏或 B 型肝炎、人類免疫缺乏病毒感染及心臟病史、糖尿病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是肺結核藥物(如: rifampin)、抗癲癇藥物、抗凝血藥物、強心劑 digoxin、心律不整藥物 amiodarone、降膽固醇藥物 (-statins)、抗人類免疫缺乏病毒藥物、免疫抑制劑 (如:ciclosporin)及聖約翰草(St. John's Wart)等
3. 若有服用含鎂、鋁的制酸劑，需間隔 4 小時。若有服用質子幫浦抑制劑，建議於投予質子幫浦抑制劑前 4 小時隨食物投予。
4. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到

完全控制病毒複製。

5. 常見副作用為疲倦、頭痛、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立即就醫：肝炎(嘔吐、食慾減少、黃疸等)、皮膚紅疹、胸悶、呼吸困難、心跳過慢。
7. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，做為一種預防措施，懷孕期間不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
哺乳：本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。