



藥物成分	劑型	櫃號
Felodipine E.R.	口服藥	

版本：TPE202309／檔號：2023-592

☞ 藥品商品名及含量

紛落持續釋放膜衣錠 10 毫克/錠 (Felopine®)
順壓樂 5 毫克/錠 (Fedil S.R®)

☞ 藥品作用

1. 高血壓。
2. 心絞痛。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，每次 1 到 2 粒，固定時間服用。藥物應整粒吞服，不可嚼碎/剝半/或研磨。
2. 醫師可能依照您的臨床症狀調整使用劑量，請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告知您的醫師，是否有藥品過敏史及您目前正在服用的其它藥物，特別是心臟用藥(如毛地黃【digoxin】、β阻斷劑、抗凝血劑、quinidine 等)、抗癲癇藥(如 phenytoin、carbamazepine 等)或 rifampicin、cimetidine、lithium、cyclosporine 等。
2. 服藥期間請避免服用葡萄柚或葡萄柚汁。
3. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正在使用的藥物。
4. 常見副作用為水腫、潮紅、頭痛、心悸、暈眩、疲倦。這些反應與劑量有關，通常是暫時性的且會隨時間而消退。
5. 若您有下列任一症狀：過敏反應(搔癢、蕁麻疹、喉頭腫脹)或低血壓、胸痛、心跳不規則、異常出汗、昏厥、噁心嘔吐等持續數日或逐漸惡化時請立即就醫。
6. 不建議用於懷孕或即將懷孕的婦女。女性計畫懷孕或已懷

臺北市立

聯合醫院

孕就診時請務必告知醫師。本藥可能會分泌到乳汁中，若有哺乳需求請事先諮詢醫師/藥師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。