

藥物成分

劑型

櫃號

Diosmin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-160

☞ 藥品商品名及含量

艾歐復隆膜衣錠 500 毫克/錠 (Alvolon F.C.)

法迪朗膜衣錠 500 毫克/錠 (Dasmin F.C.)

☞ 藥品作用

協助改善慢性靜脈功能不全引起之局部腫脹或疼痛(淋巴水腫和靜脈曲張)、痔瘡症狀之緩解。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒隨餐服用。
2. 急性痔瘡發作：前四日每日 3 次，每次 1 粒；接下來三日每日 2 次，每次 1 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是半乳糖不耐症。
2. 作為緩解痔瘡時，若短期治療後症狀無緩解請回診。
3. 用於治療靜脈循環疾病時可搭配生活型態改善(例如避免過度日曬、久站或過重)，或可諮詢醫師使用彈性襪。
4. 常見副作用可能有頭痛、暈眩、噁心、腸胃道不適、搔癢、過敏，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸、低血壓。
6. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。