



藥物成分	劑型	櫃號
Dutasteride	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-177		

☞ 藥品商品名及含量

理得順軟膠囊 0.5 毫克/膠囊 (Rasteride)

適尿通軟膠囊 0.5 毫克/膠囊 (Avodart)

☞ 藥品作用

治療有症狀的攝護腺肥大症，緩解相關症狀，減少急性尿滯留之發生率。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，需吞服整粒膠囊，可與食物併服或空腹服用。
2. 切勿嚼食或打開膠囊服用，直接接觸膠囊內容物可能對口腔咽部黏膜造成刺激。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 Dutasteride、其他 5-alpha reductase 抑制劑過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物或是有其他疾病。
3. 本藥可經由皮膚吸收，婦女及兒童應避免接觸破損的膠囊，可能因此而吸收 Dutasteride，對男性胎兒可能造成胎兒異常的危險，若接觸到破損的膠囊，應立即以肥皂及清水沖洗接觸處。
4. 常見副作用為性慾降低、輕度的勃起不能。
5. 服用本藥期間及停藥 6 個月內不可捐血，這段延遲期間目的是防止接受輸血的孕婦接觸到 Dutasteride。
6. 本藥可能對胎兒造成異常的危險，禁用於婦女及兒童。