



藥物成分

劑型

櫃號

Bisacodyl

肛門栓劑

版本：TPE202309／檔號：2023-061

☞ 藥品商品名及含量

"明德"秘瀉樂栓劑 (秘可舒) 10 毫克/栓劑 (Bisadyl)

"永信"無秘栓劑 10 毫克/栓劑 (Bisacodyl)

☞ 藥品作用

廣泛應用於便秘之緩解

☞ 使用方式

1. 使用前徹底清潔雙手，將包裝去除，並把栓劑前端浸入溫水浸泡。
2. 左邊朝下側躺，將右膝彎到靠近胸部(慣用左手者則右邊朝下側躺，將左膝彎到靠近胸部)。
3. 利用手指將栓劑塞到直腸深處，塞入後停留數秒讓栓劑留置，儘量讓栓劑留在該處越久越好。

☞ 注意事項

1. 經常或持續服用本藥會讓您依賴使用瀉下劑來排便，而讓大腸喪失正常蠕動能力，長期過度使用可能導致液體和電解質不平衡或是反彈性便秘。
2. 若服用一星期後仍不能有規律的排便，或肛門出血，則應該與醫師連絡。
3. 雖然bisacodyl導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有下列症狀加重或持續情形，請告知您的醫師：腹瀉、胃部不適、刺激感、胃部絞痛。
4. 若有下列症狀，請立刻停藥並盡快通知您的醫師：血便、嚴重絞痛、疼痛、虛弱、暈眩、直腸出血。
5. 不要將此藥給十歲以下的小孩服用。

☞ 其他注意事項

1. 本藥品限使用於肛門，若藥品過軟時，請置於低溫待較硬後再使用。
2. 婦女懷孕時用藥的安全性尚未確立，因此對於孕婦或可能

有懷孕者，若判斷於治療上有益勝於危險性時始得始藥。

3. 規律飲食及運動對於正常的腸胃蠕動功能是重要的。每天應攝取高纖食物及足量的水(六至八杯)。避免吃導致便秘的食物，如乾乳酪。如果您正攝取低糖、低卡或低鈉食物，在服用刺激性緩瀉劑以前請與您的醫師或藥師討論。
4. 將藥物儲存在室溫，並置於小孩拿不到的地方，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。可將過期或不再需要的藥物送回附近藥局檢收。