



藥物成分

劑型

櫃號

Alfuzosin HCl

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-016

## ☞ 藥品商品名及含量

列優治持續性藥效錠 10 毫克/錠 (Lafuzo XL prolonged release tablets)

札特持續性藥效錠 10 毫克/錠 (Xatral XL)

## ☞ 藥品作用

治療良性前列腺肥大。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，晚飯後立即服用。
2. 本藥請整顆吞服。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病特別是嚴重肝功能不全、嚴重腎功能不全、腸阻塞。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓藥。
3. 對於冠狀動脈功能不全之患者，不應單獨處方 Alfuzosin。應持續進行其對於冠狀動脈功能不全之治療。若心絞痛症狀復發或加重，應停用 Alfuzosin。
4. 常見副作用為噁心、胃痛、腹瀉、暈眩、頭昏感、虛弱感 (malaise)、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀請立刻就醫：暈厥、嚴重心悸、姿勢性低血壓。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮

臺北市立聯合醫院  
藥劑科  
醫師/藥師 諮詢

