



藥物成分	劑型	櫃號
Nemonoxacin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-678		

☞ 藥品商品名及含量

太捷信膠囊 250 毫克/膠囊(Taigexyn)

☞ 藥品作用

本藥品為抗生素，適合使用於門診治療之輕度成人(18歲以上)社區性肺炎

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 2 粒，空腹服用(在進食前至少兩小時或進食後至少兩小時服用)，以水整粒吞服。
2. 請依照醫師指示服藥，並將整個療程的藥物服用完畢，不可自行停藥、調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是喹諾酮類(quinolone)過敏及腎功能不全、心律不整、重症肌無力及癲癇的人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含鐵、鋁、鈣、鎂等製劑、抗心律不整藥物、紅黴素、抗精神病藥、三環類抗憂鬱藥和降血糖藥物。
3. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
4. 服藥期間應避免與牛奶、鈣片、鐵劑或含鋁、鈣、鎂等制酸劑併服，建議至少間隔 2-4 小時，以免影響藥品療效。
5. 常見副作用為腹瀉、噁心嘔吐、暈眩、肝指數異常，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重腹瀉、肌肉無力、肌腱炎(肌腱疼痛腫脹)及肝臟疾病相關徵兆，如食欲不振、黃疸等。

臺北市立

7.

本藥品用於懷孕婦女、青少年及兒童的安全性尚未確立，因此禁用於以上族群。於哺乳中婦女的安全性尚未確立，服藥期間不建議哺乳。