



藥物成分	劑型	櫃號
Saxagliptin/ Dapagliflozin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-738		

☞ 藥品商品名及含量

控糖穩膜衣錠 5 毫克/10 毫克/錠 (Qtern Film-Coated Tablet)

☞ 藥品作用

本藥透過刺激胰島素分泌與減少腎臟對葡萄糖的再吸收，從而降低空腹和餐後血糖濃度。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1 次，每次 1 粒，在早晨隨餐或空腹服用。請整錠吞服，請勿將錠劑壓碎、切開或咀嚼。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，本藥禁用於腎功能 (eGFR) 低於 45 mL/min/1.73 m²、末期腎病或接受透析的病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ketoconazole、atazanavir、clarithromycin、indinavir、itraconazole、nefazodone、nelfinavir、ritonavir、saquinavir 和 telithromycin。
3. 常見副作用上呼吸道感染、尿路感染、頭痛、腹瀉等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果發生嚴重過敏反應(皮疹、面部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、呼吸困難)、皮膚水泡、血尿、生殖器感染、體重迅速增加、四肢腫脹、胰臟炎、嚴重關節疼痛症狀，建議就醫。

臺北市立

5. 在懷孕婦女中，依據動物數據顯示，dapagliflozin 具有對腎臟的不良作用，不建議在懷孕的第二和第三孕期中使用。

6. 女性在哺乳期間不建議使用。