

藥物成分

劑型

櫃號

Cefuroxime Axetil

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-102

☞ 藥品商品名及含量

喜華膜衣錠 250 毫克 (Ceflour film coated tablets)

☞ 藥品作用

為廣效性頭孢菌素類抗生素，抑制細菌細胞壁合成，用於治療特定細菌引起的感染症。一般用於治療泌尿系統、呼吸道、皮膚、軟組織感染。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1-2 次，每次 1-2 粒，一次療程 5-10 天。
請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 需服用完整治療期間，不可擅自停藥。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 建議飯後服用，食物可以幫助藥品吸收。
2. 同時使用 H2 受體拮抗劑(H2 blockers)或氫離子幫浦抑制劑(PPIs)，可能會減少此藥品的吸收，須特別注意。
3. 對頭孢菌素(Cephalosporin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有過敏反應，應避免使用。
4. 對盤尼西林(Penicillin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有交互過敏的情形，須謹慎使用。
5. 腎臟功能不全的患者，應於就診時告知醫師或詢問藥師，可能需要調整用藥方式。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。