



藥物成分

劑型

櫃號

**Flupentixol/
Melitracen**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-217

☞ 藥品商品名及含量

永康緒膜衣錠 0.5 及 10 毫克/錠 (Mocalm F.C.)

福錄喜膜衣錠 0.5 及 10 毫克/錠 (Fluxel F.C.)

☞ 藥品作用

治療焦慮症、憂鬱症。

☞ 服用方式

1. 本藥通常每日 1-2 粒。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝功能不良**，有精神疾病、憂鬱症、癲癇、躁動症、心血管疾病、糖尿病、青光眼。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是**單胺氧化酶抑制劑(MAOI)**、lithium、抗憂鬱劑、抗癲癇藥、鎮靜劑、安眠藥等。
3. 應嚴密監視患者臨床病徵變化，若惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，請隨時與醫師聯絡。
4. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的嗜睡作用。
6. 常見副作用為錐體外症候群(如痙攣、帕金森氏症)、視覺異常、失眠、不安、噁心嘔吐、體重增加，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：抽筋、言語困

難、紅疹、皮膚癢、心跳不正常、呼吸吞嚥困難、眼睛皮膚發黃。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示可能有發生不良反應的機率，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。