

藥物成分	劑型	櫃號
Betamethasone Lidocaine Phenylephrine	外用藥膏	
版本:TPE202309/檔號:2023-652		

## **50** 藥品作用

- 1. Betamethasone具有抗發炎和抗過敏效果。
- 2. Lidocaine具有表面麻醉作用,可減輕疼痛及搔癢症狀。
- 3. Phenylephrine具有末梢血管收縮作用,可抑制痔瘡出血。
- 4. 三種成分配合使用,同時具有止痛、止癢、止血、抗發炎 及消除痔核作用,可治療內外痔、痔瘡出血、肛門裂等問 題。

## **80** 使用方式

- 1. 使用藥膏前後都請務必以肥皂清潔雙手。
- 2. 通常一天使用 2-3 次,使用前請先將患部洗乾淨,再以適量軟膏直接塗抹於患部。
- 3. 如果需要使用於直腸內痔時,請將軟膏套上軟管,小心插入肛門內,輕壓軟膏管將藥膏擠入,軟管清潔後可於下次再用。

## 80 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
- 2. 本藥限於皮膚外用不得內服,不得使用於眼睛四周。
- 3. 請置於小孩與寵物接觸不到的地方。
- 4. 請保存在陰涼處,避免陽光直曬。
- 5. 常見副作用為局部刺激、灼熱感。,但一般都不嚴重,若 症狀惡化且無法忍受請回診。
- 6.2 歲以下兒童使用,請事先諮詢醫師或藥師。