



藥物成分

劑型

櫃號

Indomethacin

外用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-240

## ☞ 藥品商品名及含量

麻腫消凝膠 10 毫克/公克 (Methacin gel)

## ☞ 藥品作用

暫時緩解局部疼痛。

## ☞ 使用方式

依症狀每日塗擦患部數次即可。

## ☞ 注意事項

1. 曾因本藥成分引起過敏者禁用。
2. 偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、發疹少有腫脹乾燥感、輕微刺激感。
3. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
4. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
5. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
6. 非類固醇抗發炎劑，不可使用超過二星期。
7. 本藥可能會隱蔽細菌感染之病徵，如有其他潛在細菌、黴菌感染的問題，應避免單獨使用本藥。皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用非類固醇抗發炎藥會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
8. 皮膚受傷時，使用本藥會引起短暫的刺激，應注意使用。
9. 為防止兒童誤食請妥善保管。