



藥物成分	劑型	櫃號
Flurbiprofen	外用藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-218		

☞ 藥品商品名及含量

富帝芬 40 毫克/片 (Flur Di Fen)

菲比藥膠布 40 毫克/片 (Flurbi Pap)

☞ 藥品作用

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱韌鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的局部鎮痛、消炎。

☞ 使用方式

1. 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼 2~3 次，可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部。
2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。
3. 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因 NSAID 誘發氣喘、皮膚感染症。
2. 每片可持續作用 6-8 小時，貼布與皮膚接觸時間勿超過 8 小時，以免發生接觸性皮膚過敏、紅疹，若使用後若有皮膚症狀(癢、發紅、發疹)，應立即撕下。
3. 常見副作用為輕微的皮膚症狀(癢、發紅、發疹)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 請勿使用於眼睛四周、粘膜、濕疹、傷口。
5. 兒童須詢問醫師或藥師，並在保護者指導監督下，才可使用。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。