



藥物成分	劑型	櫃號
Betamethasone /Neomycin	眼用藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-311		

☞ 藥品商品名及含量

比達爽眼用軟膏 2 毫克及 3.5 毫克/克 (Betason-N)

☞ 藥品作用

可治療眼瞼結膜、角膜、鞏膜、脈絡膜等疾病。

☞ 使用方式

1. 通常每日 1~3 次，適量塗抹於患部。

2. 操作步驟：

(1) 清洗雙手後將蓋子取下。

(2) 將頭向後稍微仰起，並輕輕將下眼瞼往下拉。

(3) 將眼藥膏置於眼前與眼睛平行處，沿著下眼瞼由內而外擠出適當的量，勿將管口接觸眼睛。

(4) 點完藥膏後輕閉眼睛並轉動眼球至各方向。

(5) 蓋上蓋子，再次清洗雙手。

3. 請依照醫師指示點藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記點藥，請立即補點，但若已接近下一次點藥時間，在下次用藥時間點藥即可，不可為了補點而用雙倍劑量。

4. 同時使用兩種以上之眼藥，請先用藥水再用藥膏，並間隔至少 5 分鐘。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是病毒性結膜和角膜疾病、結核性眼疾、真菌性眼疾、急性化膿性眼疾。

2. 本藥含皮質類固醇，長期使用可能會引起眼內壓增高、視覺機能減退、後囊下內障。

3. 眼用製劑請勿吞服。

4. 開封 4 週後，未用完之殘藥請丟棄。

5. 治療期間建議暫時勿配戴隱形眼鏡。

6. 常見副作用為眼睛灼熱、刺激感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**【過敏反應(皮膚紅疹或是疑似血管性水腫)】**。

8. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。