



藥物成分

劑型

櫃號

Perampanel

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-337

☞ 藥品商品名及含量

癲控達膜衣錠 2 毫克/錠 (Fycompa Film Coated Tablets)

☞ 藥品作用

治療癲癇。

☞ 服用方式

1. 每日睡前服用 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。不慎忘記服藥時，若為單次忘記服藥，應等待並依原定服藥時間投予下一次劑量；若超過一次忘記服藥，應在回診時告知醫師，避免影響療程效果。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全、腎功能不全或乳糖不耐受症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是併服 CYP3A 酵素誘導性抗癲癇藥物(例如 carbamazepine, phenytoin, oxcarbazepine)時，會降低藥品的作用；併服含有 levonorgestrel 之避孕藥時，會降低避孕藥效用，建議治療期間及完成治療一個月內採取其他避孕措施。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的負面行為和精神影響作用。
4. 常見副作用為嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：情緒症狀惡化出現易怒或有攻擊性等行為、產生自殺意念、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。