



藥物成分

劑型

櫃號

Dasatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-567

## ☞ 藥品商品名及含量

柏萊膜衣錠 20 毫克/錠 (Sprycel F.C.)

柏萊膜衣錠 50 毫克/錠 (Sprycel F.C.)

## ☞ 藥品作用

抗癌標靶藥，可減緩或停止體內癌細胞的生長，治療費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病及急性淋巴性白血病。

## ☞ 服用方式

1. 通常 1 天服用 1 次，每次 2~3 粒(由醫師依病情判斷)。
2. **藥錠不可磨碎或切割，需整粒吞服**，飯前飯後服用皆可。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾有心律不整、肝功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，例如**制酸劑(需與本藥隔開 2 小時使用)**、強效 CYP3A4 誘發劑/抑制劑，azole 類抗黴菌藥、巨環類抗生素、抗病毒藥 (atazanavir、ritonavir)、rifampicin、famotidine(一種胃藥)。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球數量較低，**請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒、喉嚨痛、虛弱、發燒或小便灼熱疼痛等症狀。**
5. 常見副作用為噁心、嘔吐、疲倦、腹痛/腹瀉、頭痛、骨髓抑制、輕微水腫、皮疹、出血等，但一般都不嚴重，

若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：貧血、帶血/黑色糞便、不明原因大片瘀血、全身或下肢水腫、呼吸困難/胸痛合併咳嗽、紅疹。

7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。