



藥物成分

劑型

櫃號

Pipoxolan HCl

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-345

## ☞ 藥品商品名及含量

柔瓦拉辛膜衣錠 10 毫克/錠 (Rowaprxin)

必迫瘧錠 10 毫克/錠 (Pipoxin)

## ☞ 藥品作用

緩解平滑肌之痙攣，可以用於痙攣所引起的疼痛。

## ☞ 服用方式

1. 通常每天服用 1~3 次，每次 1~3 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、攝護腺肥大。
2. 請告訴您的醫師目前有在服用的藥物，特別是抗組織胺、amantadine、三環抗憂鬱劑或抗精神病藥。
3. 可能的副作用為暈眩、噁心、頭痛、排尿困難，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 資料顯示懷孕禁止使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師