



藥物成分	劑型	櫃號
Pioglitazone/ Metformin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-701		

☞ 藥品商品名及含量

愛妥蜜膜衣錠 15/850 毫克/錠 (Actosmet F.C. Tablets)

雙革醣膜衣錠 15/850 毫克/錠 (Lodigit F.C. Tablets)

☞ 藥品作用

本藥會降低血糖，適用於配合飲食和運動，以改善第二型糖尿病患者的血糖控制。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒且需持續使用無需間斷。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟病、腎臟病變、腎臟功能不全、肝臟病變、急慢性代謝性酸中毒、正在使用含碘顯影劑等疾病患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 triumeq、rifampicin、isoniazid、glyburide、furosemide、nifedipine、phenytoin、陽離子藥物(digoxin、quinidine、ranitidine、trimethoprim 和 vancomycin)、thiazides 和其他利尿劑、甲狀腺藥物、雌激素、類固醇等。
3. 使用本藥應盡量避免飲酒，並定期監測空腹血糖及 HbA1c。
4. 常見副作用為腸胃道不適、腹瀉、頭痛、感冒跡象、體重改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、搔癢、起泡或剝脫皮膚、呼吸困難)、骨痛、視力改變、排尿困難等。

臺北市立

6. 本藥可能會出現低血糖症狀，請至糖尿病衛教室索取低血糖衛教單張。

7. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。