



藥物成分	劑型	櫃號
EMB/INH/ PZA/RMP	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-730		

☞ 藥品商品名及含量

立剋核-4 (AkuriT-4[®])

祛核-四合膜衣錠 (Trac 4 Tablets[®])

Rifampin **150mg**

Isoniazid **75mg**

Pyrazinamide **400mg**

Ethambutol **275mg**

☞ 藥品作用

立剋核-4 及祛核-四合膜衣錠是四種藥物固定劑量組合的抗肺結核藥物，是根據世界衛生組織的推薦，提供在結核病的治療時，服用方便和幫助病患順從的服藥。

☞ 服用方式

1. 依體重分級：30-37kg 者每日口服 2 粒，38-54kg 者每日 3 粒，55-70kg 者每日 4 粒， ≥ 71 kg 者可考慮投與每日 5 粒。
2. 於餐食 1 小時前或餐後 2 小時服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，特別是對 Rifampin、Isoniazid、Ethambutol 和任何賦型劑有過敏病史的病患禁止使用。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑、類固醇、毛地黃製劑、口服避孕藥、口服降血糖製劑、含氫氧化鋁之制酸劑、抗心律不整藥物 quinidine、免

疫抑制劑 cyclosporin、抗黴菌藥 ketoconazole、抗癲癇藥 phenytoin。

3. 服藥期間禁止飲酒。
4. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
5. 服用本藥可能會使尿、糞便、口水、唾液、汗液和淚液染成紅橙色(有戴隱形眼鏡者可能會著色)。
6. 常見副作用為噁心、嘔吐、胃部不適、視力模糊、臉部潮紅、短暫肝功能測試異常、搔癢、周邊神經炎、血清尿酸值升高，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：因任何病因發生急性肝臟疾病、視神經炎、周邊神經病變、急性痛風的突然發作。
8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。