



藥物成分	劑型	櫃號
Podophyllotoxin	外用藥膏	

版本：TPE202309 / 檔號：2023-705

☞ 藥品商品名及含量

第一項商品未決標

舊商品：(暫)克疣寧乳膏 (Khoiou Cream)

☞ 藥品作用

經由抑制細胞生長，引發細胞壞死，進而消除濕疣。用於治療生殖器疣(包括外生殖器及肛門附近的疣)。

☞ 使用方式

1. 建議每日早晚各使用一次，使用連續三天後，停藥四天(此為一個治療週期)。第一個週期結束後，若仍未治癒，請重複上述治療週期，最多可使用四個治療週期。若未改善，請回診向醫師諮詢。
2. 使用乳膏前，先用肥皂及清水清洗患部並擦乾。

☞ 注意事項

1. 避免塗抹於眼睛、健康的組織上。不慎誤觸眼睛時，應以大量清水沖洗。不可塗抹於開放性或出血的傷口。正常皮膚若不慎觸及，請用肥皂及清水洗淨
2. 建議治療期間避免性行為。若有性行為時應使用保險套。
3. 副作用為塗藥部位刺激不適(紅斑、發癢、灼熱感等)、脫皮、結疤、起水泡等。
4. 懷孕婦女及授乳婦女使用本品之相關資料有限。
5. 存放於 25°C 以下。
6. 使用時可利用此紀錄表。

日數	1	2	3	4,5,6,7	8	9	10	11,12,13,14
日期								
早				停藥四天				停藥四天
晚								
日數	15	16	17	18,19,20,21	22	23	24	25,26,27,28
日期								
早				停藥四天				停藥四天
晚								